

Blood Donor Education Material

READ THIS BEFORE YOU DONATE!

We know that you would not donate unless you think your blood is safe. However, in order for us to assess all risks that may affect you or a patient receiving a transfusion, it is essential that you answer each question completely and accurately. If you don't understand a question, ask the blood center staff. All information you provide is confidential

To determine if you are eligible to donate, we will:

- Ask about your health and travel
- Ask about medicines you are taking or have taken
- Ask about your risk for infections that can be transmitted by blood – especially AIDS and viral hepatitis
- Take your blood pressure, temperature and pulse
- Take a blood sample to be sure your blood count is acceptable

Travel to or birth in other countries

Blood donor tests may not be available for some infections that are found only in certain countries. If you were born in, have lived in, or visited certain countries, you may not be eligible to donate.

If you are eligible to donate, we will:

- Clean your arm with an antiseptic. Tell us if you have any skin allergies
- Use a new, sterile, disposable needle to collect your blood

WHAT HAPPENS AFTER YOUR DONATION?

To protect patients, your blood is tested for several types of hepatitis, HIV, syphilis, and other infections. If your blood tests positive it will not be given to a patient. There are times when your blood is not tested. If this occurs, you may not receive any notification. You will be notified about any positive test result which may disqualify you from donating in the future. The blood center will not release your test results without your written permission unless required by law (e.g. to the Health Department).

DONOR ELIGIBILITY – SPECIFIC INFORMATION

Certain diseases, such as AIDS and hepatitis, can be spread through sexual contact and enter your bloodstream. We will ask specific questions about sexual contact.

What do we mean by “sexual contact?”

The words “have sexual contact with” and “sex” are used in some of the questions we will ask you, and apply to any of the activities below, whether or not a condom or other protection was used:

- Vaginal sex (contact between penis and vagina)
- Oral sex (mouth/tongue on someone's vagina, penis, or anus)
- Anal sex (contact between penis and anus)

HIV/AIDS risk behaviors

HIV is the virus that causes AIDS. It is spread mainly by sexual contact with an infected person OR by sharing needles or syringes used by an infected person for injecting drugs.

Do not donate if you:

- Have ever had HIV/AIDS or have ever had a positive test for the HIV/AIDS virus
- Have used needles to take any drugs not prescribed by your doctor **IN THE PAST 3 MONTHS**
- Have taken money, drugs or other payment for sex **IN THE PAST 3 MONTHS**
- Have had sexual contact **IN THE PAST 3 MONTHS** with anyone who has ever had HIV/AIDS or has ever had a positive test for the HIV/AIDS virus, ever taken money, drugs or other payment for sex, or ever used needles to take any drugs not prescribed by their doctor
- Are a male who has had sexual contact with another male, **IN THE PAST 3 MONTHS**
- *Are a female who has had sexual contact **IN THE PAST 3 MONTHS** with a male who has had sexual contact with another male **IN THE PAST 3 MONTHS***
- Have had syphilis or gonorrhea **IN THE PAST 3 MONTHS**
- Have been in juvenile detention, lockup, jail or prison for 72 or more consecutive hours **IN THE PAST 12 MONTHS**
- Have a history of Ebola virus infection or disease

Do not donate to get a test! If you think you may be at risk for HIV/AIDS or any other infection, do not donate simply to get a test. Ask us where you can be tested outside the blood center.

Do not donate if you have these symptoms which can be present before an HIV test turns positive:

- Fever
- Enlarged lymph glands
- Rash

Your blood can transmit infections, including HIV/AIDS, even if you feel well and all your tests are normal. This is because even the best tests cannot detect the virus for a period of time after you are infected.

IMPORTANT NEW INFORMATION

DO NOT DONATE if you:

- **Are taking any medication to prevent HIV infection these medications may be known by you under the following names: PrEP, PEP, TRUVADA, or DESCOVY.**
- **Have taken such a medication in the past 3 months.**
- **Have EVER taken any medication to treat HIV infection (antiretroviral therapy or ART).**
- **The principle known as “Undetectable = Untransmittable” does not apply to the potential risk to patients who receive transfusions.**

DO NOT donate if your donation might harm the patient who receives the transfusion.

THANK YOU FOR DONATING BLOOD TODAY!

SunCoast Blood Centers
941-954-1600

Blood Donor Education Material

¡LEA ESTO ANTES DE DONAR!

Sabemos que no donaría a menos que crea que su sangre es segura. Sin embargo, a fin de evaluar todos los riesgos que pueden afectarle a usted o a un paciente que recibe una transfusión, es indispensable que respondas cada pregunta completamente y con precisión. Si no entiende una pregunta, pregunte al personal del banco de sangre. Toda la información que proporcione es confidencial

Para determinar si eres elegible para donar:

- Preguntaremos acerca de su salud y viaje.
- Preguntaremos sobre medicamentos que está tomando o ha tomado.
- Preguntaremos acerca de su riesgo de infecciones que pueden transmitirse por sangre – especialmente el SIDA y la hepatitis viral.
- Tomaremos la presión arterial, temperatura y pulso. Tomaremos una muestra de sangre para estar seguros que su conteo sanguíneo es aceptable

Viajar o nacer en otros países

Es posible que las pruebas de donantes de sangre no estén disponibles para algunas infecciones que solo se encuentran en ciertos países. Si nació, ha vivido o visitado ciertos países, es posible que no sea elegible para donar.

Si usted es elegible para donar:

- Limpiaremos el brazo con un antiséptico. Informenos si tienes alguna alergia de la piel.
- Usaremos una aguja nueva, estéril y desechable para coleccionar la sangre.

QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE SU DONACIÓN

Para proteger a los pacientes, la sangre se analiza para detectar varios tipos de hepatitis, VIH, sífilis y otras infecciones. Si sus análisis de sangre son positivos, no se le administrará a un paciente. Hay ocasiones en las que no se analiza la sangre. Si esto ocurre, es posible que no reciba ninguna notificación. Se le notificará sobre cualquier resultado positivo de la prueba que pueda descalificarlo de donar en el futuro. El banco de sangre no divulgará los resultados de sus pruebas sin su permiso por escrito a menos que lo exija la ley (por ejemplo, al Departamento de Salud).

ELEGIBILIDAD DE DONANTES – INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Ciertas enfermedades, como SIDA y hepatitis, pueden transmitirse por contacto sexual y entrar en el torrente sanguíneo. Haremos preguntas específicas sobre contacto sexual.

¿Qué entendemos por "contacto sexual"?

Las palabras "tiene contacto sexual con" y "sexo" se utiliza en algunas de las preguntas que le haremos y aplicará a alguna de las actividades a continuación, a pesar de utilizar o no un condón u otra protección:

- Sexo Vaginal (contacto entre pene y vagina)
- Sexo Oral (boca o lengua en la vagina, pene o ano de otra persona)
- Sexo Anal (contacto entre pene y ano)

VIH/SIDA comportamientos de riesgo

VIH es el virus que causa el SIDA. Se transmite principalmente por contacto sexual con una persona infectada O por compartir agujas o jeringas usadas por una persona infectada para inyectarse drogas.

No done si usted:

- Tiene VIH/SIDA o ha tenido una prueba VIH/SIDA positiva.
- Si alguna vez utilizo agujas para tomar cualquier medicamento no prescrito por su doctor EN LOS ULTIMOS 3 MESES
- Ha aceptado dinero, drogas u otra pago por sexo EN LOS ULTIMOS 3 MESES
- Ha tenido contacto sexual EN LOS ULTIMOS 3 MESES con alguien que alguna vez tuvo VIH/SIDA o ha tenido una prueba VIH/SIDA positiva.
- Es hombre que ha tenido contacto sexual con otro hombre, EN LOS ULTIMOS 3 MESES
- Es una mujer que ha tenido contacto sexual EN LOS ULTIMOS 3 MESES con un hombre que ha tenido contacto sexual con otro hombre EN LOS ULTIMOS 3 MESES
- Ha tenido sífilis o gonorrea EN LOS ULTIMOS 3 MESES
- Ha estado en detención de menores, cárcel o prisión por más de 72 horas consecutivas EN LOS ULTIMOS 12 MESES
- Tiene una historia de infección o enfermedad por el virus de Ebola

¡No done para obtener una prueba! Si usted piensa que pudiera tener riesgo de VIH/SIDA o cualquier otra infección, no done simplemente para obtener una prueba. Preguntenos donde puede obtener prueba fuera del banco de sangre.

No done si usted tiene los siguientes síntomas los cuales pueden estar presentes antes de una prueba de VIH dar positiva:

- Fiebre
- Agrandado los ganglios linfáticos
- Dolor de garganta
- Erupción

Su sangre puede transmitir infecciones, incluyendo VIH/SIDA, aunque se sienta bien y las pruebas sean normales. Esto sucede porque incluso los mejores exámenes, no pueden detectar el virus por un período de tiempo después de que usted está infectado.

NUEVA INFORMACIÓN IMPORTANTE

NO DONE si usted:

- **Está tomando cualquier medicamento para prevenir la infección por el VIH, estos medicamentos pueden ser conocidos por usted con los siguientes nombres: PrEP, PEP, TRUVADA o DESCOVY.**
- **Ha tomado un medicamento de este tipo en los últimos 3 meses.**
- **ALGUNA VEZ ha tomado algun medicamento para tratar la infección por VIH (terapia antirretroviral o TAR).**
- **El principio conocido como "Indetectable = No Transmisible" no se aplica al riesgo potencial para los pacientes que reciben transfusiones.**

NO done si su donación puede dañar al paciente que recibe la transfusión.