

*SunCoast Blood Centers*  
*Sarasota, FL*

**BLOOD DONOR EDUCATIONAL MATERIAL FOR  
EBOLA VIRUS DISEASE OR INFECTION**

For use during periods without widespread transmission

**Please DO NOT DONATE BLOOD if you**

- Have **EVER** had Ebola virus disease or infection

---

**BLOOD DONOR EDUCATIONAL MATERIAL FOR  
EBOLA VIRUS DISEASE OR INFECTION**

For use during periods with widespread transmission

This information applies following the CDC's classification of one or more countries as having "widespread transmission or cases in urban areas with uncertain control measures" at this link: <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html>.

Blood collection facilities must reduce the risk of collecting blood and blood components from a donor who may be infected with Ebola virus. It is possible that an Ebola virus infected person may not have symptoms of infection during the incubation period. In addition, anyone who has **EVER** had Ebola virus infection or disease may be at risk for transmitting the virus through blood donation, regardless of the length of time since recovery.

Ebola virus is transmitted from human to human by direct exposure to body fluids (such as blood, urine, stool, saliva, semen, vaginal fluids or vomit) from infected individuals. Healthcare workers, and family and friends providing care may have direct exposure to body fluids of infected patients. If direct exposure occurs, a person is at high risk of developing Ebola virus infection and must not donate blood or blood components.

**DO NOT DONATE BLOOD if:**

- You have **EVER** had Ebola virus disease or infection
- In the **PAST 8 WEEKS**, you have lived in, or travelled to, a country with widespread Ebola virus disease or infection.
- In the **PAST 8 WEEKS**, you have had sexual contact with a person has **EVER** had Ebola virus disease or infection, regardless of the length of time since recovery.
- In the **PAST 8 WEEKS**, you have had direct exposure to the body fluids (such as blood, urine, stool, saliva, semen, vaginal fluids or vomit) of a person with Ebola virus disease or infection, including a person under investigation.
- In the **PAST 8 WEEKS**, you have you been notified by a public health authority that you may have been exposed to a person with Ebola virus disease or infection.

**PLEASE CONTACT THE DONOR CENTER, if you develop the following symptoms within the 8 week period following donation:**

Fever  
Severe Headache  
Muscle Pain and Weakness  
Fatigue

**followed by:**

Diarrhea  
Vomiting  
Abdominal Pain  
hemorrhage (bleeding or bruising)

**SunCoast Blood Centers**  
**Sarasota, FL**

**MATERIAL EDUCATIVO DE DONANTE DE SANGRE PARA  
ENFERMEDAD POR EL VIRUS DEL EBOLA O INFECTION**

Para uso durante períodos sin transmisión generalizada

**Por favor, NO DONE SANGRE si usted**

- Ha tenido **ALGUNA VEZ** enfermedad o infección por el virus del Ebola

---

**MATERIAL EDUCATIVO DE DONANTE DE SANGRE PARA  
ENFERMEDAD POR EL VIRUS DEL EBOLA O INFECTION**

Para uso durante períodos con transmisión generalizada

Esta información se aplica siguiendo la clasificación del CDC de uno o más países con "transmisión generalizada o casos en áreas urbanas con medidas de control inciertas" en este sitio:

<http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html>.

Las instalaciones de colección de sangre deben reducir el riesgo de coleccionar sangre y componentes sanguíneos de un donante que pueda estar infectado con el virus del Ébola. Es posible que una persona infectada por el virus del Ébola no presente síntomas de infección durante el período de incubación. Además, cualquier persona que **ALGUNA VEZ** haya tenido una infección o enfermedad por el virus del Ébola puede estar en riesgo de transmitir el virus a través de la donación de sangre, independientemente del tiempo transcurrido desde la recuperación.

El virus del Ébola se transmite de persona a persona por exposición directa a fluidos corporales (como sangre, orina, heces fecales, saliva, semen, fluidos vaginales o vómitos) de personas infectadas. Los trabajadores de la salud y los familiares y amigos que brindan atención pueden estar expuestos directamente a los fluidos corporales de los pacientes infectados. Si se produce una exposición directa, una persona tiene un alto riesgo de desarrollar la infección por el virus del Ébola y no debe donar sangre ni componentes sanguíneos.

**NO DONE SANGRE si:**

- **ALGUNA VEZ** ha tenido la enfermedad o infección por el virus del Ébola
- En las **ÚLTIMAS 8 SEMANAS**, ha vivido o viajado a un país con una enfermedad o infección generalizada por el virus del Ébola.
- En las **ÚLTIMAS 8 SEMANAS**, ha tenido contacto sexual con una persona que **ALGUNA VEZ** ha tenido la enfermedad o infección por el virus del Ébola, independientemente del tiempo transcurrido desde la recuperación.
- En las **ÚLTIMAS 8 SEMANAS**, ha tenido exposición directa a los fluidos corporales (como sangre, orina, heces, saliva, semen, fluidos vaginales o vómitos) de una persona con la enfermedad o infección por el virus del Ébola, incluida una persona bajo investigación.
- En las **ÚLTIMAS 8 SEMANAS**, una autoridad de salud pública le notificó que pudo haber estado expuesto a una persona con la enfermedad o infección por el virus del Ébola.

**POR FAVOR CONTACTE CON EL CENTRO DONANTE, si desarrolla los siguientes síntomas dentro del período de 8 semanas después de la donación:**

Fiebre

Dolor de cabeza intenso

Dolor y debilidad muscular

Fatiga

seguido de:

Diarrea

Vómitos

Dolor abdominal

Hemorragia (sangramiento o hematomas)